

IMPLANT DENTAIRE

Un **implant dentaire** est une racine en titane que l'on visse dans l'os, dans le but de remplacer la ou les racines d'une **dent manquante**.

Ensuite cet implant dentaire est recouvert d'une couronne (prothèse).

La pose de l'**implant dentaire** passe par une phase chirurgicale réalisée sous anesthésie locale.

Les étapes du traitement implantaire

Phase pré-implantaire préparatoire :

Consultations, radiographies, scanner éventuel, études des différentes solutions, discussion, proposition de devis et établissement du plan de traitement.

Méthode classique :

① Phase implantaire :

Le chirurgien implantologiste pose le (ou les) implant(s) le plus souvent avec une anesthésie locale (anesthésie générale dans quelques cas).

Les suites sont équivalentes à l'extraction d'une dent.



② Désenfouissement :


Après environ 3 mois de cicatrisations (délai selon l'os et la zone implantée) un dégagement de la gencive qui recouvre la tête de l'implant est pratiqué sous anesthésie locale.

Une vis de cicatrisation en titane est posée. Elle déborde de la gencive pour permettre une belle cicatrisation de celle-ci.



③ Phase prothétique :

Environ 8 à 15 jours après le désenfouissement, la prothèse d'usage (couronne céramique ou bridge implantaire) est élaborée puis posée par le chirurgien-dentiste.



Consignes post-opératoire

① DOULEUR :

Souvent modérée, celle-ci peut survenir après l'intervention et peut être d'intensité variable selon les cas. Prenez le médicament prescrit contre la douleur avant que celle-ci n'apparaisse, dès que possible. Renouvelez cette prise au besoin. Ne pas dépasser la dose quotidienne prescrite. NE PAS PRENDRE D'ASPIRINE, OU DERIVES.

② SAIGNEMENT :

Un saignement discret teintant de rouge la salive est normal les 2 à 3 premiers jours. Evitez de rincer et de cracher, ceci aggravant l'hémorragie. Si le saignement est persistant, mordez une compresse sèche pliée à l'endroit qui saigne pendant 30 minutes et appliquez une poche de glace sur la joue.

③ OEDEME :

Votre joue peut gonfler. Appliquez pendant les premières heures un sac de glace sur la joue. La tuméfaction est à son maximum le 2^{ème} jour. Evitez la chaleur.

④ TEMPERATURE :

Elle peut atteindre 38°C pendant les 48 premières heures.

⑤ BAINS DE BOUCHE :

Ne faites pas de bain de bouche, le jour de l'intervention. Débutez le lendemain ainsi que les brossages des dents.

⑥ CE QU'IL FAUT MANGER :

Mangez en évitant les aliments et les boissons chaudes les 2-3 jours suivant l'intervention. Evitez les aliments durs ou blessants (chips, croûtes de pain...)

⑦ HEMATOME :

Un hématome (bleu) de la joue ou du cou est fréquent et sans gravité. Il peut apparaître dans les jours qui suivent l'intervention.

⑧ FILS :

Les fils en bouche sont à retirer 8 à 10 jours après l'intervention (selon mention particulière du chirurgien)

⑨ PROTHESES :

Si vous avez une prothèse amovible qui recouvre la zone de la pose des implants, évitez de la porter tant que la cicatrisation n'est pas complète (selon indications de votre chirurgien)

⑩ EVITEZ DE FUMER

Entretien de vos implants dentaires

*En dehors de contrôles périodiques dans notre cabinet,
l'hygiène quotidienne est primordiale pour une bonne santé
et la longévité de vos implants (et de vos dents !)*

① BROSSAGE :

Brossage des dents et couronne sur implants, trois fois par jour environ 3 minutes.

Bien brosser la face externe et interne en allant de la gencive vers la dent.



② BROSSETTES INTERDENTAIRES :

Passer les brochettes et/ou fil dentaire entre les couronnes au moins une fois par jour

Toutes ces consignes sont indicatives et peuvent être modifiées par votre praticien